

醫心方卷第三



醫心方卷第三

從五位下行賦博士兼丹波介丹波宿禰康賴撰

風病證候第一

治一切風病方第二

治偏風方第三

治半身風方第四

治風痙方第五

治柔風方第六

治頸風方第七

治中風口禁方第八

治中風口喎方第九

治中風舌強方第十

治中風失音方第十一

治中風聲嘶方第十二

治卒聲喑方第十三

治中風驚悸方第十四

治中風身不仁方第十五

治中風四肢不屈申方第十五

治中風身如虫行方第十七

治中風隱軀方第十八

治中風隱軀生瘡方第十九

治中風癰病方第二十

治中風言語錯亂方第二十一

治中風癰病方第二十二

治中風狂病方第二十三

治虛熱方第二十四

治客熱方第二十五

風病證候第一

黃帝大素經云風者百病之長也至其變化為他



治中風言語錯亂方第廿一

治中風痙病方第廿二

治中風狂病第廿三

治虛契方第廿四

治客契方第廿五

風病證候第一

黃帝大素經云風者百病之長也至其變化為他

病也無常方

楊上善云百病曰風而生變為萬病又云人之生也感風氣以生其為病也曰風氣為病又云九宮

經曰冬至之日太一至坎宮天心應之以風雨寒暑從太一所居鄉未向中宮名為實風長養萬物若風從南方來向中宮為衝後未虛正

成傷人者也

素問經云千病萬病無病非風

醫門方云凡人性稟五行曰風氣而生長風氣雅

能長物還能為害傷人如水浮舟亦能覆舟

源論云中風者風氣中於人也風是四時之氣

分布八方主長養萬物從其鄉來者而人少死病

不從其鄉來者人多死病其為病也藏於皮膚之

間內不得通外不得泄其人經脈行於五藏者各隨

藏府而生病焉

心中風但得濡卧不得傾側汗出若膚赤汗流者可

治急灸心俞百壯若膚或青或白或黃或黑此是心

壞為水面目亭之時悚動皆不可復治五六日而

而死肝中風但踞坐不得仰頭若繞兩目連額上色

微有青膚色青面黃可治急灸肝俞百壯若大青黑



心中風但得僵卧不得傾側汗出右脅赤汗流者可

治急灸心俞百壯若膚或青或白或黃或黑此是心

壞為水面目亭之時悚動皆不可復治五六日而

而死肝中風但踞坐不得仰頭右繞兩目連額上色

微有青膚色青面黃可治急灸肝俞百壯若大青黑

面一黃一白者是肝已傷不可復治數日而死

脾中風踞而腹滿轉通黃吐酸汗出者可治急灸

脾俞百壯若手足青者不可復治也

腎中風踞而腰痛視脇左右未有黃色如餅糲大

者可治急灸腎俞百壯若齒黃赤鬚髮直面上

色者不可復治也

肺中風僵卧而脅滿短氣胃悶汗出視目下鼻上

下兩邊下行至口色白可治色急灸肺俞百壯若色

黃為肺已傷化為血不可復治其人當安臥或

自拈衣如此數日而死

小品方云說日風者四時五行之氣也分布八方順

十二月於三百六十日各以時從其鄉來為正風在天

地為五行在人為五藏之氣也万物生成之所順非

毒厲之氣也人當舉之過不勝其氣乃病之自

惟病然有自差者也加治則易食愈其風非時至

者則為毒風也不治則不能自差焉今則列其證



十二月終三百六十日各以時從其御來為正風在天  
地為五行在人為五藏之氣也萬物生成之所順非  
毒厲之氣也人當舉之過不勝其氣乃病之可  
惟病然有自老者也イニ加治則易食愈其風非時至  
者則為毒風也不治則不能自養焉イニ今則列其證  
如左

春甲木東方清風傷之者為肝風入頭頸肝頸  
愈中為病多汗惡風喜怒兩脇痛惡血在內飲食  
不下支節時腫顏色蒼泄イニ益乾仇イニ頤イニ

夏丙丁火南方湯風傷之者為心風入胃脇府藏  
心愈中為病多汗惡風焦悍イニ苦悲顏色赤潤泄イニ

清穀仲夏戊己土同南方陽風傷之者為脾風  
入背脊脾愈中為病多汗惡風肌肉痛身體急

瘠イニ四肢不欲動不嗜食顏色黃毒因人虛實之  
變陽氣有餘陰氣不足者則內外生熱在中者

令人晝臥イニ若陽氣不足陰氣有餘者則內如有寒  
從中出腸鳴而痛秋庚辛金西方涼風傷之者

為肺風入肩背肺愈中為病多汗惡風寒熱  
欬動肩背顏色白濡然病瘰癧イニ晝老夕甚イニ

冬壬癸水北方寒風傷之者為腎風入腰股四肢  
腎愈中為病多汗惡風腰脊肩背頸項痛不

又作鼻  
巨鳩及  
寒鼻塞  
也  
泄私列餘  
制三又癰  
歌也  
之氣

蓋  
說文



從中出腸鳴而痛秋庚辛金西方涼風傷之者

為肺風入肩背肺俞中為病多汗惡風寒熱

欬動肩背顏色白濡然病瘵晝夜甚

冬壬癸水北方寒風傷之者為腎風入腰股

腎俞中為病多汗惡風腰脊肩背頸項痛不

能久立便出曲難不利陰痺按之不得小便腹脹

癰然有澤腫時眩顏色黑令人厥

右四時正氣之風乎人當單之過得病證候如此

又云四時風惣名春九十日清風夏九十日湯風秋九

十日涼風冬九十日寒風其氣分布八方亦各異名

也太一之神隨節居其鄉各卅五日風雲皆應之

今列其風名如左

東北方艮之氣立春王為條風一名五風王卅五日

東方震之氣春分王為明庶風一名嬰兒風王卅五日

東南方巽之氣立夏王為清明風一名弱風王卅五日

日南方離之氣夏至王為景風一名大飈風王廿七日

合仲夏也仲夏中央之氣主三南方之氣代已王十

八日合夏至合卅五日風名同

西南方坤之氣立秋王為涼風一名謀風王卅五日

西方乾之氣秋分王為闔闔風一名對風王卅五日

西北方乾之氣立冬王為不周之風一名折風王卅五日

北方坎之氣冬至王為廣莫風一名大剛風王卅五日

作癰  
莫江反病  
困也

居月反  
尸厥也  
玉篇作  
癰氣注



八日合夏至合卅五日風名同

西南方坤之氣三立秋王為涼風一名謀風王卅五日

西方兌之氣三秋分王為闔闔風一名對風王卅五日

西北方乾之氣三立冬王為不周之風一名折風王卅五日

北方坎之氣三冬至王為廣莫風一名大剛風王卅五日

右八方之風各從其鄉來主長養主長養萬物人民少死病也

又云八方風不從其鄉來而從衝後來者為虛邪賊害

萬物則人民多死病也故聖人說避邪如避矢也邪者

風也令人壽夭多病是不知避邪也為病證候如左

凶風之氣內舍大腸中外在腠勝骨下四支節解中

書本遺其病證今無也

嬰兒風為病令人筋筋其氣內舍肝中外在筋中

弱風為病令人體重其氣內舍胃中外在肉中

大弱風為病令人發其氣內舍心中外在脉中

謀風為病令人弱四支緩弱也其氣內舍脾中外在

肌中

剛風為病令人燥者枯燥瘦瘠也其氣內舍肺中

外外在皮中

折風為病則因人脉絕時而泄利脉閉時則結不通

喜暴死也其氣內舍小腹中外在右手太陽中

作燥  
先通又



肌中

作燥  
先通又  
乾之

剛風為病令人燦<sub>カ</sub>者枯燦<sub>カ</sub>瘦瘠也其氣內舍肺中

外在皮中

折風為病則因人脉絕時而泄利<sub>カ</sub>脉閉時則結不通

喜暴死也其氣內舍小腹中外在右手太陽中

大飢風為病令人寒<sub>カ</sub>者患<sub>カ</sub>不能自溫也其氣內

舍腎中外在骨中有脊<sub>セキ</sub>勸中也

又作脊  
又作脊字林  
云脊骨也  
又作脊骨  
姓太嶽生  
禹心呂之  
呂侯封至  
呂侯

右八風從其衝後來者為病如此

又云新食竟取風為胃風其狀惡風頸多汗<sub>カ</sub>下塞

不通食飲不下脹滿<sub>カ</sub>形瘦腹大失衣則填滿食寒則

洞泄<sub>カ</sub>

目眩取風為漏風其狀惡風多汗<sub>カ</sub>少氣口乾渴<sub>カ</sub>近衣則

身熱如火燒臨食則汗流如雨骨節<sub>カ</sub>解惰不欲目營

新沐浴竟取風為首風其狀惡風面多頭痛<sub>カ</sub>

新房室竟取風為泄風其狀惡風汗流沾衣

勞風之為病喜在肺使人強上<sub>カ</sub>惡風寒戰目眩<sub>カ</sub>漾

出<sub>カ</sub>候之三日中及五日中不精明者是也七八日

則微有清黃膿<sub>カ</sub>涕如彈丸大從口鼻中出為善也

若不出則傷肺<sub>カ</sub>今案大素經

又云風者其氣毒行而穀變在人肌膚中內不得

泄外不得散<sub>カ</sub>目人動靜乃變其性其證如左

有風過寒則食不下<sub>カ</sub>遇熱則食自消<sub>カ</sub>寒熱



淫出候之三日中及五日中不精明者是也七八日  
則微有清黃膿涕如彈丸大從口鼻中出為善也

若不出則傷肺今案大素經  
強上好作也

又云風者其氣毒行而穀變在人肌膚中內不得

泄外不得散目人動靜乃變其性其證如左

有風遇寒則食不下遇熱則肌肉消寒熱

有風遇陽盛則不得汗遇陰盛則汗自出

肥人有風肌肉厚則難泄毒為熱中自黃

瘦人有風肌肉薄則恒外行身中寒自淚出

有風遇實則湊理開則內伏令人熱悶若目熱食

汗欲通湊理得開其風自出則覺肉中如針刺步行

運方欲汗之如此

有風遇虛湊理開則外出淒然如寒然覺身中有

如水淋時如竹管吹處

脉驗方云風者天地山川之氣也所發近遠有焉

其一是天地八方四時五行之氣為遠風也其風

騷騷鼓振者此則山川間氣為近風耳騷由鼓肩動

於手握之間便能致風之能動物之能病人而非天

地之氣也

又云經言諸取風者非是時行承氣之風之非山川

鼓振之風也此人間淫巷門戶窓牖之淫氣耳天



醜  
餘招友

近也

無風之日其恒有逢風人長居其間積日月以能虛

間廣澤都亭成遙風三不可居卧也復有賦生恒

身驗其事者甚衆才亮今略記其三條於後章

貼  
玉簫天叶  
及以物質  
錢

周  
羊  
中  
必  
得  
病  
致  
死  
遂  
成  
空  
癡  
無  
復  
生  
者  
有  
一  
毛  
兒  
常

出市先每歲輒覓貨主非復舊人乞兒問知又多死疾

源一品便著貼中巧准見貨主坐處九背約一柱有一虫

食<sup>ツ</sup>穴<sup>ツ</sup>故<sup>ツ</sup>取<sup>ツ</sup>有<sup>ツ</sup>風<sup>ツ</sup>貫<sup>ツ</sup>過<sup>ツ</sup>如<sup>ツ</sup>箴<sup>ツ</sup>頭<sup>ツ</sup>大<sup>ツ</sup>正<sup>ツ</sup>射<sup>ツ</sup>坐<sup>ツ</sup>人<sup>ツ</sup>項<sup>ツ</sup>即<sup>ツ</sup>是<sup>ツ</sup>

風府處七兒計疾源一品人坐所當皆是其項所

對死當由此便詣市官求貼坐之厨寒此孔遂无復

病安全永保其富此其驗也

今有父家作北向聽事閣在南架下主人四月中溫

病オ逐キ涼ヒラ開フ闢フ心フ首フ閣フ卧フ乃フ詆フ脉フ之フ作フ五フ六フ過フ來フ去フ

後其作一過來至開上注不進寸口而去或作五六過

來後而乍一過亭主寸口下昂去永疏如此意次亦

全難徑有  
十二經時有  
動脈獨取  
寸口以決五  
藏六腑  
死生之法  
又云寸口者  
脈之大會  
手大陰之  
脈動也



對死當由此便詣市官求貼坐之卧寒此孔遂元復

病安全永保其富此其驗也

金難經  
十二經時有  
動脈獨取  
寸口以候五  
藏六府  
死生之法  
又云寸口者  
脈之大會  
手太陽之  
脈動也  
又云從關  
至尺內  
候之所  
治也

今有一人家作北向聽事閣在南架下主人四月中溫

針灸經  
手有內  
關外關  
華佗脈  
訣云寸尺  
位各八分  
關上修三  
寸五分  
一寸九分

病逐涼開闢心首閣卧乃詠脈之作五六過來去

又云寸口者  
脈之大會  
手太陽之  
脈動也  
又云從關  
至尺內  
候之所  
治也

後其作一過來至關上注不進寸口而去或作五六過

又云寸口者  
脈之大會  
手太陽之  
脈動也  
又云從關  
至尺內  
候之所  
治也

來後而作一過停住寸口不昂去脈既如此意欲久詠

又云寸口者  
脈之大會  
手太陽之  
脈動也  
又云從關  
至尺內  
候之所  
治也

者其變通其家內人應從閣內經過便暫閉閣之開

又云寸口者  
脈之大會  
手太陽之  
脈動也  
又云從關  
至尺內  
候之所  
治也

之後脈便不復住關上及停寸口中於是仍令其

又云寸口者  
脈之大會  
手太陽之  
脈動也  
又云從關  
至尺內  
候之所  
治也

且閉閣久詠脈者則不覺復停住關上寸口也試復

又云寸口者  
脈之大會  
手太陽之  
脈動也  
又云從關  
至尺內  
候之所  
治也

開閣少時風來甚遙脈還復停住關上寸口中仍復

又云寸口者  
脈之大會  
手太陽之  
脈動也  
又云從關  
至尺內  
候之所  
治也

還閉閣即復調病人要煩永不肯還膚中避風而

又云寸口者  
脈之大會  
手太陽之  
脈動也  
又云從關  
至尺內  
候之所  
治也

脈冷湯以除溫遂病瘡絕而死矣是以明知遙氣之

又云寸口者  
脈之大會  
手太陽之  
脈動也  
又云從關  
至尺內  
候之所  
治也

風不可久當也

又云寸口者  
脈之大會  
手太陽之  
脈動也  
又云從關  
至尺內  
候之所  
治也

有一家作三間屋開中央一間南北對作都戶安一

又云寸口者  
脈之大會  
手太陽之  
脈動也  
又云從關  
至尺內  
候之所  
治也

床當中央夫婦便坐其中監者事經一年許夫婦

又云寸口者  
脈之大會  
手太陽之  
脈動也  
又云從關  
至尺內  
候之所  
治也

甘中風口禁死也

又云寸口者  
脈之大會  
手太陽之  
脈動也  
又云從關  
至尺內  
候之所  
治也

治一切風病方第二

又云寸口者  
脈之大會  
手太陽之  
脈動也  
又云從關  
至尺內  
候之所  
治也

蒼婆方治一切風病日月殷方

又云寸口者  
脈之大會  
手太陽之  
脈動也  
又云從關  
至尺內  
候之所  
治也

秦膠八分獨活八分二味切搗篩為散以酒服一方寸

又云寸口者  
脈之大會  
手太陽之  
脈動也  
又云從關  
至尺內  
候之所  
治也

上日二還遂四時之四季作服之春散夏湯秋丸冬

又云寸口者  
脈之大會  
手太陽之  
脈動也  
又云從關  
至尺內  
候之所  
治也

酒四季煎膏

又云寸口者  
脈之大會  
手太陽之  
脈動也  
又云從關  
至尺內  
候之所  
治也

又云治男婦老幼一切風病之風之木頭重痛良劑



治一切風病方第二

耆婆方治一切風病日月散方

秦膠八分獨活八分二味切搗節為散以酒服方寸

上日二還遂四時之四季作服之春散夏湯秋丸冬

酒四季煎膏

又云治男女老小一切風病之風之狀頭重痛眼闇

四肢沉重不舉不隨頭悶心悶煩躁手足疼痛腫

氣不能多食嗔怒憂思健忘多夢悟悟之只欲

睡卧癩起面目失色房事轉弱漸自瘦不能勞動

之方病即發万病並主之方

人參白鮮防風防己芍藥秦膠獨活老小各兩

右七味切以水一斗并煮取二升分為六服

一方以水六升煮取一升半分為三服之之相去

十里分六服者相去廿里令了助無相惡宜久

服之延年益智聰慧湯服訖散服方寸匕

酒服酒三斗漬之一宿少飲之煎服少服

之丸服蜜和為丸如大豆一服十四丸並用

酒服之其分兩一依前法恒逐四時常令服使

人不生方病

范汪方治風有十品一日入頭之重耳塞鼻仇目視

眩之三日入肥膚皮隱軫發瘡生瘡三日入筋之急



之九服蜜和為丸。如大豆。一服十四丸。並用酒服之。其分兩一依前法。恒逐四時常令服。使

人不生方病

范汪方治風有十品。一日入頭。二重耳。寒鼻。仇目。視

眩。二日入肥。膚皮。隱軀。發瘡。生瘡。三日入筋。之。急

縮痛。四日入脉。之。動。上下。無常。五日入骨。齒。齕。脛

疼。酸。不能久立。六日入心。堆。悒。悒。怒。目。悲。自。毒。七

日入肺。令人欬。逆。桓。氣。晝。暮。夜。劇。八日入肝。頭。眩。

目。視。不明。九日入脾。令人腸。鳴。舌。上。創。兩。脇。不。心。滿

堅。閉。不利。十日入腎。令人身。中。雷。鳴。甚。則。膿

出。治之。防風丸方

芎藭四分 蜀椒三分 一方 貝母三分 防風二分

一方 當歸二分 一方 白芷二分 一方 梔子一分 一方

木二分 一方 凡八物 治下節丸 以蜜如彈丸

頓服一丸 先食 禁食生果 猪肉 生菜 服

藥十三日 風當出去 當有熱 家隨以水洗之

小品方小續命湯治卒中風 欲死 身體緩急 口目

不正 舌強 不能語 奄奄 惚惚 精神悶亂 諸風 服

之皆驗 不令人虛方

甘草一兩 麻黃一兩 防風一兩半 防己一兩 大桑一兩



良 今案厥驗方云如梧子以好酒服  
三九日二不知稍增可至十九

小品方小續命湯治卒中風欲死身體緩急口目  
不正舌強不能語奄々惚々精神悶亂諸風脹  
之皆驗不令人虛方

甘草一兩麻黃一兩 防風一兩半 附子一兩  
黃芩一兩桂心一兩 附子一枚 芍藥一兩 芍藥一兩  
生薑五兩

石十一物以水九升煮取三升分三服甚良不寒更

合三四劑必佳取汗隨人風輕重虛實也有人脚

弱服此方至六七劑得差有風痲家天陰節

變輒合之可以防瘡癰也

挫要方云療風病多逢有失音不得語精神如醉

人手足俱不得運用者有能言語手足不廢精神

昏恍不能對人者有不能言語手足精神昏亂有

言語手足精神俱不異乎常而發作有時每發昂

狂言語高聲大叫得定之後都不自醒者有諸事

不異尋常發作有時每發則狂走叫喚者有諸事

不異尋常發作有時每發昂作牛羊禽獸聲

醒後都不自覺者有諸事不異尋常發作有時

每發昂頭旋目眩頭痛眼花心悶輒生經文定方

者有諸事不異尋常發作有時每發輒發塊頭



不異尋常發作オモルコト有時每發則狂走クハシ叫喚セウケン者有諸事

不異尋常發作有時每發昂作牛羊禽獸聲

醒後都不自覺者有諸事不異尋常發作有時

每發昂頭旋目眩頭痛眼花心悶輒生經久定方

者有諸事不異尋常發作有時每發輒發熱頭

痛流汗不自勝舉者此等諸風形假雖別尋其源也

俱失於養本氣既羸偏有所損或以男女或以飲食或

以思慮或以勞役既極於事能不敗乎常量已所歸而

捨割之靜思息事兼助以藥物之有可復之理風有緣

飲酒過草不能言語手足不遂精神昏恍得病經

一兩日且依後生葛根等湯服之

生葛根ナツミキ一挺長一尺徑三寸生薑シヤウ二大合竹瀝チヤウ二大升

如不可得宜物キレ薊竹根キヤウ大一升切以水一大斗ヌルキ緩火煎

取二大升以代竹瀝如竹瀝根不可得ヌルキ以薊竹葉

細切一大升以水二大升如上法煎取二大升以代瀝

如元竹葉宜細切コチカ束ユタ一大斗以水一大斗煎取

二大升代之

右先取生葛根淨洗刷便ギヤウ槌碎且宜シタ追取汁令

盡訖又搗シラ昂竹瀝シラ瀝シラ搗シラ追取汁盡為度用

和生薑汁シラ綿瀝シラ之細シラ暖服之不限迴數及食

服之如經七日以後服附子等湯之



二大升代之

右先取生葛根淨洗アカイ刷便シヤブ槁碎カウサイ且宜シタラ取汁令盡シラシ訖又搗シラシ昂竹瀝シラシ瀝シラシ搗シラシ取汁シラシ盡シラシ為度用

和生薑汁シラシ綿シラシ瀝シラシ之細シラシ暖シラシ服之不限迴數及食シラシ前シラシ食シラシ後シラシ如シラシ經シラシ七日以後服シラシ附子等湯之シラシ

雜酒方治一切風病獨治酒方シラシ

獨沽五兩黑大豆三升シラシ煮シラシ令シラシ凡二物以酒一斗漬之五シラシ

日始服日三多少任意但大豆者漬之二日出シラシ去シラシ

脉驗方云帝釋六時服呵梨勒丸方

右呵梨勒者具五種味辛シラシ酸シラシ苦シラシ鹹シラシ甘シラシ服シラシ无忌治

一切病大消食益壽補益シラシ令人有威德延年シラシ

是名最上仙藥療シラシ廿八種風痺塊大便不通體シラシ

枯乾燥面及遍身黃者痔赤目下部疼痛シラシ

久壯熱一切心痛頭旋悶耳痛重聽有身體シラシ

癰疽積年不瘳シラシ痢不思食淡冷有胃中シラシ

歌シラシ味シラシ膚色白于シラシ燥シラシ瀝シラシ小便稠數シラシ腸シラシ脹シラシ瘰氣初シラシ

患水病者療シラシ腎破シラシ無无顏色シラシ黃腸內虫脚氣シラシ

上吐无力支節疼痛血脉不通心上似有物シラシ

勇健忘心迷如是等皆悉シラシ去除也シラシ

呵梨勒皮八分シラシ檳榔人シラシ參シラシ三分シラシ橘皮六分シラシ

伏苓四分シラシ芒消四分シラシ獨シラシ春シラシ三分シラシ豉四分シラシ



患水病者療腎破無元顏色黃腸內虫脚氣  
上吐元力支節疼痛血脉不通心上似有物  
勇健忘心迷如是等皆悉去陳也

可梨勒皮八分檳榔人八分人參三分橘皮六分

茯苓四分芒消四分獨活三分豉四分

大黃八分干薑十二分桃人八分牽牛子

十三兩桂心八分

凡十三味受咀下篩以蜜丸如梧子服廿九食  
前以溫酒若薄粥汁服平且得下利良

### 治偏風方第三

病源論云偏風者風邪偏客於身一邊也人體有偏

虛者風邪乘虛而傷之故為偏風也其狀或不

知痛癢或緩或縱或痺痛是也

千牛經日一邊偏風可鼻不通午脚不隨者取胡

麻油煎青木香咒三七遍摩拭身上永差

### 龍門方治卒偏風方

以草火灸令遍身汗流立差

又方大麻子搗以酒和絞取汁溫服發差立

佳

又方黑胡麻搗末酒漬服七日後差驗

撻要方療偏風脹之三日內能起方



以草火灸令遍身汗流三炷

又方大麻子搗以酒和絞取汁溫服發並之

又方黑胡麻搗末酒漬服七日後暴驗

撻要方療偏風脹之三日內能起方

羌活獨活  
一名也

羌活三兩桂心二兩 于薑二兩 附子二顆

炮

右以水一升半煮取半大升分二服

治半風方第四

病源論云風半身不隨者脾胃氣弱而氣偏虛

為風邪所乘故也

千金方治大風半身不隨方

羌鼠壤土袋盛熨之

又方蜃沙熟蒸作練袋三枚各受七升熨盛一袋著患處如冷即取餘袋一依前法數換之

又方灸風池肩髃曲池陽陵泉巨虛下廉

治風症方第五

病源論云風症者口禁不開背強而直如莢癰之

狀其重者耳中窠痛卒然身體症直者死也

由邪傷於大陽經復遇寒濕則發症也

効驗方治風症身強方

蒸大豆慰之 又方蒸鼠壤土熨之取汗



病源論云風症者口禁不開背強而直如莢癰之

狀其重者耳中榮痛卒然身體症直者死也

由邪傷於大陽經復遇寒濕則發症也

効驗方治風症身強方

蒸大豆慰之千金方又方蒸鼠壤土熨之取汗

新脈方治風症身強方

薄荷三枚以水六升煮取二升分二服

葛氏方若身直不得屈伸及覆者方

取槐皮黃白者切以酒若水六升煮得二升去滓

稍服

蕪敬本草注治風症方

銅屑令極熱投酒中服五合日三

又方鐵屑炒使極熱投酒中飲酒良

本草替穀治風症方

蒸蠶沙熨之

治柔風方第六

病源論云柔風者血氣俱虛風邪並入在於陽則支

臂緩在於陰則腹裏急而支不能自收震急不得

作息也

小品方治中柔風身體疼痛四肢緩弱欲作不隨方

羌活三兩桂枝三兩生薑六兩干地黄三兩



治風方第七

病源論云柔風者血氣俱虛風邪並入在於陽則皮

膚緩在於陰則腹裏急血氣不能自收震急不得

作息也

小品方治中柔風身體疼痛四支緩弱欲作不隨方

本草云桂枝湯

羌活三兩桂肉三兩生薑六兩干地黄三兩

葛根三兩芍藥三兩麻黃二兩甘草二兩

一名桂心

凡八物以清酒三升水五升煮取三升溫服五合日

三二升水八升大驗

葛氏方治中緩風四支不收者方

豉三升水九升煮取三升分三服日二作亦可酒漬

黃飲

治頭風方第七

病源論云風頭眩者由血氣虛風邪入於腦而引目

系故也

養生方云飢食作臥久成氣病頭風

又云飢食沐浴作頭風

耆婆方治人一切風氣風眩病三光散方

秦膠十二分伏神十二分獨活八分

三味切搗篩為散以酒服方寸匕日三依日月法

又云治人風氣風眩頭面病四時散方

秦膠獨活伏神署預



又云風食沫酒作頸風

耆婆方治人一切風氣風眩病三光散方

秦膠十二分 伏神十二分 獨活八分

三味切搗篩為散以酒服方寸匕日三依日月法

又云治人風氣風眩頭面病四時散方

秦膠獨活伏神暑預

四味切搗篩為散以酒服方寸匕日二依日月法

春各四分 夏各二分 秋各八分 冬各十二分

又云治人風氣風眩頭面風病五藏散方

秦膠獨活伏神暑預山茱萸八兩依四時散五味

五味切搗篩為散以酒服方寸匕日二依日月散法

又云治人風氣風眩頭面風病中風病五時散方

秦膠獨活伏神暑預山茱萸本依時散

兩六味切搗篩為散以酒服方寸匕日二依月

散法

又云治人風氣風眩頭中風病中風脚弱風濕痺

病七星散方

秦膠獨活伏神暑預天雄山茱萸

七味切搗篩為散以酒服方寸匕日二依四時散法

又云治人風氣風眩頭面風中風濕痺脚弱房少精

八風散方

秦膠獨活伏神暑預山茱萸本天雄



痼疾

秦膠獨活伏神 暑預天雄山茱萸 高本

七味切搗篩為散以酒服方寸匕日二服四時散法

又云治人風氣風眩頭面風中風濕痺肺弱房少精

八風散方

秦膠獨活伏神 暑預山茱萸 高本天雄 鍾乳

乳 研七

八味切搗篩為散以酒服方寸匕日二服四時散法

依日月散法

又云治人風氣風眩頭面風中風脚弱風濕痺弱房

少精傷寒上痛中惡冷病十善散方 一名十方散

秦膠獨活伏神 暑預山茱萸 高本天雄

鍾乳 研七 夕藥 干薑

十味切搗篩為散以酒服方寸匕日二服四時散

八兩

千金方治風頭眩口鳴目痛耳聾大三五七散方

天雄三兩 細辛三兩 山茱萸五兩 干薑五兩 暑

預七兩 防風七兩 六兩下篩為散漬酒服五升

二日再不知稍加

又云小三五七散 主頭風目眩方

天雄三兩 山茱萸五兩 暑預兩七

三味下篩青盲眼五升二日再不知稍增以知為度



天雄三兩

細辛三兩

山茱萸五兩 干薑五兩 暑

頤七兩

防風七兩

六兩下篩為散漬酒服五分

二日再不知稍加

又玄小三五七散主頤風目眩方

天雄三兩 山茱萸五兩 暑頤兩七

三味下篩漬酒服五分二日再不知稍增以知為度

又玄治頤風方

常以九月九日取菊花作枕袋枕頤

又方玄芥子末酢和付頤一周時覆之

又玄亭歷子煮末不過三四度愈

又方菊花獨活茵草防風細辛蜀椒星美

桂心桂蘅可作沐及慰之

酥驗方桃花散治風頤眩倒及身體風痺走皮

膚中方

石南五兩 暑頤四兩 當歸三兩 山茱萸三兩

桃花半升 菊花半升 真朱半兩 天雄一兩

凡八物合治下篩食竟酒服半錢止日三稍增之

集驗方治風頤眩倒眼旋屋轉頤眩痛防風松實

湯方

防風三兩 枳實三兩 伏神四兩 蘇黃四兩

細辛二兩 芎藭三兩 前胡四兩 生薑四兩 半夏



凡八物合治下節食竟涌脹半錢止日三補填之

集驗方治風頭眩欲倒眼旋屋轉頭眩痛防風枳實

湯方

防風三兩枳實三兩ハテシカナ伏神四兩カクタクシラ麻黃四兩ホトケ

細辛二兩アヲシホシ芍藥三兩オホナカシ前胡四兩ウツシカ生薑四兩ホソク

四兩カラモウシ杏仁三兩カラモウシ竹瀝三升カラモウシ土物切以水六升

升合竹瀝煮取二升七合分三服類眼兩三劑九

良

葛氏方治患風頭每天陰輒發眩冒者方

冒作暈  
莫報及  
伍目細視  
也

取塩一升以水半升和陰頭如絮巾裏一宿當黃

汗出愈附子屑一合内塩中尤良

又方以挂屑和苦酒塗頂上

范汪方治鼻孔偏塞中有膿血此乃是頭風所作

兼由肺疾宜服此散方

天雄オホ八分ヒ干薑五分ヒ署預四分ヒ通草六分ヒ山茱ヒ

萸六分ヒ天門冬八分ヒ凡六物治下節為散酒服

方寸匕日再稍加至二匕

桂要方療風頭痛眼眩心悶陰雨弥甚方

防風二兩ハテシカナ當歸一兩ヤブセリ山茱オホ二兩ヒ藥胡二兩ヒ署預二兩ヒ

鷄子二兩ヒ去白打ヒ黃碎ヒ

右為散用鷄子黃和散令調酒服方寸匕日三



方寸匕日再稍加至二匕

槌要方療風頭痛眼眩心悶陰雨弥甚方

防風二兩ヤブコウジ當歸一兩ムクゲリ山茱萸ハナハシ二兩ハナハシ真胡二兩ムクゲリ暑預雨

鷄子二兩去白打黃礬

右為散用鷄子黃和散令調酒服方寸匕日三

增深方治頭風方

吳茱萸三升ユルイ以水五升煮取三升以綿染汁以拭カラハシカフ髮根數用

灸頭風方

天官論云

千金方云灸天窓穴在上星後寸

灸後頂穴在百會後寸

百病尉灸云灸百會穴在頂上旋毛中

又云灸前項穴在亞會後一寸五分

又灸五處穴在當兩眼入髮際一寸

治中風口噤方第八

病源論云諸陽經筋皆在於頭三陽之筋并結入

於顙頰夫於口諸陽為風寒所客則筋急故口噤

不開也

葛氏方治口噤不開者方

取大豆五升ヒラ熬令黃黑以五升酒漬取汁イシヨ秦強

散口以護之

秦強飲去權及壓木蓋也



於厥類夫於口諸陽為風寒而客則筋急故口噤  
不開也

葛氏方治口噤不開者方

取大豆五升イリチ熬令黃黑以五升酒漬取汁シロ秦シロ強

散口以護之ヒラ

又方獨活四兩桂二兩以酒水各二升合煮取一升半

分二服溫卧セ

千金方治中風口噤方

木四兩酒三升煮取一升頓服之シケラ

又方服淡竹瀝一升

撻要方療中風口噤不知人方

豉五升茱萸一升以水七升煮三沸飲之千金方

廣利方理中風口噤不開方シケラ

獨活一大兩切以清酒二大升煮取一升半即大

豆五大合イリチ煎取煎酒イリチ投豆中密蓋經下食宿

久元過服二大合口噤即ヒカハ柳口灌之日三四度イリチ

効驗方治人卒中風欲死口不開身不得着席大豆

散方

大豆二兩イリチ薑二兩蜀椒二兩去目汗

凡三物搗下篩酒服一錢上日一愈

新錄方治口噤方



効驗方治人卒中風欲死口不開身不得着席大豆

散方

大豆二兩イリテ薑二兩イリテ蜀椒二兩去目汗

凡三物槁下篩酒服一錢上日一愈

新録方治口禁方

灸萊蕪穴在頤前下脣之下又方灸顙尖七

炷

治中風口噤方第九

病源論云風邪入於足陽明手太陽之經遇寒則

筋急引頰故使口噤言語不正而目不能卒視

養生方云夜卧當耳勿合有孔風入耳口舌噤

大素經云頰筋有寒則急引頰移口有熱則筋弛

緩不勝故辟

治之以馬膏其急者以自酒和桂以塗其緩

者以來麴之即以生來灰置之坎中高下

与坐等以膏熨急頰且飲美酒散美酒不

飲酒者自強也為之三樹而已音撫摩拊也

録驗方治口眼相引噤者方

以生薑炙血塗之以來物勿過掛暑耳也血

干復塗之用白酒勝血小品方同之

樣要療風口面噤兼暴風半身不隨語不轉方



飲酒者自強也。為之三樹而已。音撫摩拊也。

錄驗方治口眼相引。喎僻者方。

以生薑黃血塗之。以桑物之吻。遍掛著耳也。血。

干復塗之用。白酒勝血。小品方同之。

樣要療風口面喎。兼暴風半身不隨。語不轉方。

以酒煮桂心。取汁。濕故布。搦病上。則心左喎。搦。

右。喎搦左。秘不傳。常用大効。

僧深方治風著人面。引口偏著牙車。急舌不得轉方。

竹瀝一升。獨活三兩。生地黄汁一升。凡三物合煮。

取一升。頓服之。

又方。翳風穴灸三壯。主耳聾。口眼為僻。不正。

手車引口。禁不開。瘡不能言。甚神。良穴在耳。

後陷者中。按之引耳。

睨如輪又  
目動也  
又作睨

小品方云。眼睨動。口唇動。偏喎。皆風入脉故也。

急服小續命湯。摩神明膏。

又方。灸吻邊橫文赤白際。逐左右風乘。不収。

家灸隨年壯。日三報之。三報且息。三日不効。

復三報之。

千金方治中風口喎方。

炒大豆三升。令焦。酒三升。淋取汁。頓服。二日一方。同之。

又方。皂莢大者一枚。去皮子。灸一方。一灸下。篩三。



寒灸隨年壯日三報之三日不効復三報之

千金方治中風口噤方

炒大豆三升令焦酒三升淋取汁頓服二日一方同之  
又方是美大者一枚去皮子灸一方一灸下鹽  
年苦酒和塗之左噤塗右右噤塗左

集驗方治中風口噤辟不正方

取空青如來者著口中含咽之即愈  
千金方云如  
至一枚含之

葛氏方治口噤僻者方

衝灸灰口吻中橫文間覺大熱便去艾即愈  
忽勿盡艾則大過左噤灸右右噤灸左又  
方驚血秘為頭塗之欲心即拭去  
秦居媛切牛鼻環也  
一百牛拘  
漱奇奏  
秦  
欲去權又  
秦  
歷先蓋也

范汪方治中風口僻紫方

豨五升茱萸一升合煮三沸去滓飲汁神驗又方  
兩干又於頸上隨僻左右灸肘頭三四壯

經心方治口噤方

青松葉一斤搗令出汁清酒一升漬二宿近火一  
宿初服半升漸至一升頭面汗即止同之  
取衣裏麻屨邊即止

治中風舌強方第十

病源論云脾脉絡胃夾咽連舌本散舌下心之別脉



青松葉一斤搗令出汁清酒一升漬二宿近火一

宿初服半升漸至一升頭面汗昂心千金方又方

取衣裏麻屨邊昂心

治中風舌強方第十

病源論云脾脉絡胃夾咽連舌本散舌下心之別脉

係舌本令心脾二藏受風邪故舌強不得語也

范汪方治風舌強不語方

豉煮汁漸服一日可數十過不煩多

又方新好桂煎削去皮下節以三指撮著舌下

咽之又方灸廉泉穴在頰下結喉上舌本今葉華他

傳云中經穴主中風舌強不語在頰下骨裏白骨中

集驗方治卒不得語方

煮大豆取汁稍含咽之

又方取桂尺水三升煮取一升頓服之

三物含下節酒服一錢上日一汗出昂

葛氏方治中風不語方

豉柴黃各一升水五升煮取二升稍服之

又方灸第二第三椎上百五十壯

錄驗方治舌強不能語言舌下藥樊石散方

樊石二兩桂心二兩

凡二物下節量石下更無言



葛氏方治中風不語方

欬柴莫各一升水五升煮取二升稍服之

又方灸第二第三椎上百五十壯

錄驗方治舌強不能語言舌下藥樊石散方

樊石二兩桂心二兩

凡二物下篩豈舌下便能言

治中風失音方第十一

病源論云唯龍者氣之所以上下也唯厭者聲之

門戶也舌者聲之機口者聲之扉也風寒客於

喉厭之間故卒然無音故謂風失音不語

范汪方治失音大豆紫湯方

大豆一升葵令集好酒二升合煮令沸隨人多

少服取令醉

効驗方治卒風失音大豆散方

大豆葵令集蜀椒去目汗干薑各二兩

凡三物合下篩酒服一錢上日一汗出即愈

千金方治卒失音方

濃煮桂汁服一升覆取汗身熱可末桂著舌

下漸引汗

又方濃煮大豆汁含之欬之良

又方灸天窗百會穴新厥方同之



千金方治卒失音方

濃煮桂汁服一升覆取汗オホ身ミ可未桂著シ舌

下漸シ汗ミ

又方濃煮大豆汁含之ミ或シ良キ

又方灸天窓百會穴

新厥方同之

孟詵食經治失音方

杏仁三分オホ去皮オホ煨オホ作脂オホ桂心末一分オホ和如泥取李

核オホ許綿裹少咽之日五夜一又方オホ搗梨汁一合頓

服之オホ

治中風聲嘶方第十二

病源論云聲嘶者風冷傷於肺之所為也

葛氏方治卒中冷聲嘶オホ啞方

作癰又作啞音焉下久不言也

甘草一兩桂心二兩五味二兩杏仁廿枚生薑八

兩切以水七升煮取二升三服

耆婆方治人聲嘶喉中不利方

桂心杏仁子薑芎藭甘草各一分

石五味搗篩以蜜和為丸如梧子口中含咽

汁

治聲啞不出方第十三

葛氏方治卒失聲オホ啞不出方

今案病源論雅有五聲而元聲啞風啞假

橘皮五具水三升煮取一升頓服



石五味搗篩以蜜和為丸如梧子口中含咽

汁

治腎虛不出方第十三

葛氏方治卒失聲、啞不出方

今案病源論雅有五聲而元聲啞風啞喉

橘皮五具水三升煮取一升頓服

又方針大椎旁一寸五分

又方濃煮苦竹葉服之

又方搗蘘荷根酒和絞飲其汁

樊石桂末綿裹如棗內舌下有唾吐出之

耆婆方治人風啞方

寒羊角五兩炙通草二兩半防風二兩半麻二

兩甘草四兩炙

五味搗篩為散以白飲服一方寸匕日二

治中風驚悸方第十四

病源論云風驚悸者體虛心氣不足心之經為風耶

所乘也或恐懼憂患迫令心氣虛亦受邪搏於心

則驚不自安驚不已則悸動不定其狀目精不轉

而不能呼

按要方四神鎮心丸療男子讀誦健忘心神不寧

風虛弱補骨髓方

伏神十二分天門冬十二分干地黄十二分人參八分



則驚不自安驚不已則悸動不安其狀目精不轉而不能呼

按要方四神鎮心丸九療男子讀誦健忘心神不寧九風虛弱補骨髓方

伏神十二分天門冬十二分干地黄十二分人參八分去心

遠志皮八分已上蜜丸飲服十五丸日每加至卅丸

博濟女界方云治因重病虛損後或目黑慮失心驚悸心忪或夜間狂言恒常憂怕或如神不足人小兒諸驚癇等并時疾心熱等並宜服七寶鎮心丸服七寶鎮心丸

犀睛一雙金薄五十犀薄五十光明珠二分雄黃二分

牛黃二分犀珀二分真珠二分龍腦二分麝香二分

右如法研如麵以棗肉為丸如棗豆大每日空心心以井花水下三丸或五丸或七丸量而服之

小品方遠志湯治中風心氣不定驚悸言語謬誤恍惚心中煩悶耳鳴方

遠志三分去心伏苓二兩獨活四兩甘草二兩

芍藥三分去心當歸二兩桂枝三兩麥門冬三兩

半去心生薑五兩人參二兩附子一兩炮

黃耆三兩

凡十二物以水一斗二升煮取四升服八合人羸可



遠志三兩 去心 伏苓二兩 獨活四兩 甘草二兩

芍藥三兩 エヒスクリ 當歸二兩 ヤブセリ 桂枝三兩 麥門冬三兩 ヤブスグ

半 去心 生薑五兩 人參二兩 附子一兩 カウニク 炮

黃耆三兩 カハラク

凡十二物以水一斗二升煮取四升服八合人羸可

服五合日三夜一

葛氏方治人心下虛悸方

麻黃半夏分等禱容丸服如大豆三九日三

千金方云補心湯主心氣不足多汗心煩喜獨語多

夢不自覺 オホユ 准自痛時生血舌本強水漿水不通

方

紫石英二兩 麥門冬三兩 伏苓二兩 人參二分

紫菀一兩 桂心二兩 赤小豆廿四枚 甘草一兩 アカツキ

干棗廿枚 ホシナカ

九味水八升煮取二升半分三服宜春夏服

又云定志湯主心氣不足心痛驚恐方

遠志四兩 昌蒲四兩 人參四兩 伏苓四兩

四味水一斗煮取三升分三服

僧深方云定志丸治恍惚憶忘心中恐悸志不定

定風氣干藏方

人參二兩 伏苓二兩 昌蒲二兩 遠志二兩



遠志四兩 昌蒲四兩 人參四兩 伏苓四兩

四味水一斗 煮取三升分三服

僧深方云定志丸治恍惚憶忘中恐悸志不定

定風氣干藏方

人參二兩 伏苓二兩 昌蒲二兩 遠志二兩

防風二兩 獨活二兩

凡六物治下篩以蜜丸如梧子服五丸日每

今案范汪方加職  
精一合細辛四分

治中風四支不<sub>レ</sub>屈伸方第十五

病源論云風四支拘攣不得屈伸者曲體虛湊理

開風邪在<sub>レ</sub>於筋故也

小品方云張仲景三黃湯治中風手足拘攣百草

疼煩發作心亂惡寒引日不欲飲食秘方

麻黃五分 去草獨活五分 細辛一分 黃耆二分

黃芩三分

凡五物以水五升煮取二升分每服一服昂小汗出

兩服大汗出昂愈

葛氏方云若骨節疼痛不得屈伸<sub>延之</sub>則痛短氣

氣自汗出或欲腫者方

附子二兩 桂心四兩 朮三兩 甘草兩 水六升

煮取三升分三服汗出愈



凡五物以水五升煮取二升分再服一服良小汗出

兩服大汗出即愈

葛氏方云若骨節疼痛不得屈伸<sup>延つてハ</sup>近之則痛短氣氣自汗出或欲腫者方

附子二兩桂心四兩木三兩甘草兩水六升煮取三升分三服汗出愈

又云若手足不隨者方

取青布燒作炆<sup>今ク</sup>於小口器中燠<sup>フルニイタキ</sup>痛處佳

又方或三升水九升煮取三升分三服

治中風身體不仁方第十六

病源論云風不仁者由營氣虛衝氣實風寒入於肌肉使血氣行不宣流其狀搔之如障衣是也

葛氏方云若身中有制<sup>ヒキキ</sup>痛不仁不隨處者方

取干艾葉一斛許丸之內凡翫下塞<sup>モ</sup>餘目唯百

以痛處著翫目上燒艾以煙之一特間愈

又方好木<sup>ヨキ</sup>削之以水煮令濃<sup>アツク</sup>契<sup>ヒタ</sup>的<sup>ヒタ</sup>之<sup>ハ</sup>以漬<sup>ヒタ</sup>痛處<sup>ハタカニヒタ</sup>

良

治中風身體如虫行方第十七

病源論云風大虛<sup>風或ハ</sup>耶中於營衛溢於皮膚之間與虛

熱并故遊<sup>ユ</sup>乘<sup>アツキ</sup>通體狀若虫行<sup>アリク</sup>

千金方治風身體如虫行方

煮一升水一石剪成半<sup>ハサミ</sup>後清溫洗三四遍亦治一切



治中風身體如虫行方第十七

病源論云風大虛耶中於營衛溢於皮膚之間與虛  
熱并故遊乘通體狀若虫行

千金方治風身體如虫行方

塩一升水一石剪臠半澄清温洗三四遍亦治一切

風又方以大豆漬酥將米中旦温洗面頭發不淨加

少麵勿以水濯之

又方成鍊雄黃松脂分等蜜和飲服十九如梧

子曰三慎酒客塩或神祕不傳

治中風隱軀方第十八

病源論云耶氣客於皮膚復逢風相折則起風搔

隱軀

赤癰者由涼濕折於肌中之熱結成赤癰也

得天熱則刺取冷則減也

白癰者由風氣折於肌中熱之與風相搏為白癰也

得天陰雨冷則刺出風中刺得晴温則減者衣

身温之善

素問云赤軀忽起如蚊煩癢重沓龍起搔之逐年

細身起也有白軀之如此

小品方白癰方

直資角龍易少眉又谷圭



得天陰雨冷則剷出風中之刺得晴溫則滅者衣  
身溫之矣イユ

素問云赤輪忽起如蚊煩癢重沓カク龍起搔之逐之ヒタ  
起也ヒタ有白輪之如此ヒタ

小品方白癬方

宜煮シ薤シ藠シ湯シ与少酒シ以浴佳シ

又方以酒煮石南草シ拭之シ

又方水煮シ樊石シ汁シ拭之シ

又云赤癬方

宜生地シ銜草シ澹之シ最驗大法如治丹諸方

千金方治隱軫シ百治不羗方シ

景天シ一斤一名慎火シ搗シ取汁シ塗上シ熱灰シ手摸之シ

再三度即羗

又方樊石二兩シ酒三升シ漬令シ滓シ拭上シ立羗シ

又方シ薤藠シ煮湯洗之シ

又方芒消八兩水一斗シ煮取四升シ濕綿シ拭シ

又淋石シ灰汁洗シ

又方大豆三升酒六升シ煮四五沸服一盃日三

如意方治隱軫術

漏蘆作湯シ以洗浴シ

効驗方治風瘙菜萸湯方



又淋石灰汁洗

又方大豆三升酒六升煮四五沸服一盃日三

如意方治隱軫術

漏蘆作湯以洗浴セツ

効驗方治風瘙茱萸湯方

茱萸一升酒清五升凡二物合煮得五升

五合絞去滓カス適寒溫洗日三

錄驗方黃連湯治風瘙隱軫方

芒消五兩黃連五兩凡二物以水八升煮

取四升去滓洗風痒カキホク家日二良

本草薺髮風瘙隱軫方

薺ニク髮沙汁漬之ヒメセ又方梓葉單煮洗之

又方茺蔚菜可作浴湯ムハミキ

益洗食經風瘙隱軫方

煮赤小豆取汁俾冷洗之

治中風隱軫瘡方第十九カキホク

病源論云人皮膚虛為風寒所折則起隱軫寒多

則色赤風多則色白甚者瘡痛瘙之則成瘡痒カユリ

葛氏方卒得風瘙隱軫瘙之生瘡汁出初痒後痛カユク

煩悶不可堪方

燒石令赤以少水中內塩數合及熱酌以洗漬之ヒメセ



病源論云人皮膚虛為風寒所折則起隱疹寒多則色赤風多則色白甚者瘡痛搔之則成瘡

葛氏方卒得風搔隱疹搔之生瘡汁出初痒後痛

煩悶不可堪方

燒石令赤以少水中內塩數合及熱酌以洗漬之

又方劉棻皮二斗許煮令濃及熱以自洗浴

又方以塩湯洗之按蒸米泔之

又方以慎火令致搗以傅之

醫門方云煮薤藿湯和少酒以浴之極佳

劉涓子方治耳體隱疹瘡方

地榆根三兩 黃連二兩 大黃四兩 黃芩四兩

苦參八兩 甘草六兩 芍藥四兩

石七物以水六斗煮取三升半浴洗

孟洗食經云打莖單煮洗浴之

又方薤藿可作浴湯

又方煮赤小豆取汁傳令洗不過三四

又方楊葉葉對上

治中風癰病方第廿

病源論云凡癰病皆由惡風及犯觸忌客得之初覺

皮膚不仁或注之若瘡如虫行或眼前見物如虫絲

或隱癰赤黑治之新米穀看麤專食胡麻松木



又方楊葉姜對上

治中風癰病方第廿

病源論云凡癰病皆由惡風及犯觸忌客得之初覺

皮膚不仁或注之苦瘡如虫行或眼前見物如虫絲

或隱癰赤黑治之新米穀看鮭專食胡麻松木

最善然癰名不一木癰火癰金癰土癰水癰諸癰

而癰疥癰均酒癰也又有烏癰白癰論諸癰形狀在

本書依錄不載

又云酒醉露卧不幸生癰

錄驗方云有人五癰八風之法一木癰二石癰三風癰

四水癰五沸癰

草葛氏方云癰病乃有八種云

治白癰烏癰方

苦參根皮乾之麻搗以好酒三斗漬廿一日去滓

服三合日三

又方干艾葉隨多少濃煮以漬麵及飯釀如常

法酒就隨意飲恒使薰

又方取馬薪蒿一名馬矢蒿一名爛石草搗末

末服方寸匕日三百日更赤起一年都差後色

又方搗好雌雄未苦酒和雞羽染以塗瘡上乾

復塗之



法酒就隨意飲恒使薰

又方取馬薪蒿一名馬矢蒿一名爛石草搗末

末服方寸匕日三百日更赤起一年都差後色

又方搗好雌苗末苦酒和雞羽染以塗瘡上乾

復塗之

僧深方治癩方

水中荷濃煮以自漬半日用此方多愈

又方水中浮青萍濃煮自漬之

范汪方治大風癩瘡方

取葎草一擔二石水煮取石汁以漬劇不過

三漬愈

集要方治癩方

甬黃苦酒和塗之

治中風言語錯亂方第廿一

病源論云風邪者謂風氣傷於人也以身肉面氣為

正外風氣為邪若其居處失宜飲食不節致府

藏內損血氣外虛則為風邪所傷故病有五邪

一曰中風二曰傷暑三曰飲食勞倦四曰中寒五曰

中濕其為病不同中邪者發時則不自覺知狂

或妄言悲喜無度是也

僧深方五邪湯治風邪入人體中鬼語妄有所說悶



藏內損血氣外虛則為風邪所傷故病有五邪  
一日中風二日傷暑三日飲食勞倦四日中寒五日  
中濕其為病不同中邪者發時則不自覺知狂  
或妄言悲喜無度是也

僧深方五邪湯治風邪入人體中鬼語妄有所說悶  
亂恍惚不足意志不定發來注有時方

人參三兩 伏苓三兩 伏神三兩 白朮三兩 昌蒲三兩  
凡五物水一斗煮取二升半去滓先食服八合日

伏苓松脂流入  
地中千歲變  
為伏苓形如  
鳥獸龜鱉  
者良入地四  
深者七人得之

三

范汪方伏神湯五邪氣入人體中鬼語妄言有所見  
聞說心悸慙恍惚不定發作有時方

伏神三兩 昌蒲三兩 赤石脂廿枚 人參三兩 伏苓三兩  
凡五物水一斗煮取二升半分三服

經心方慈利湯治邪發無常罵詈與鬼語方

烏頭一分 恒山一分 甘草一分 慈利一分

桃花二分

五味好酒四升煎取一升頓服大吐

治中風癱病方第廿二

病源論云五癱者一陽癱二陰癱三風癱四濕癱

五馬癱也人有血氣少則心虛精神離散魂魄妄行

目為風邪所傷邪入陰則為癱疾又人在胎時其母



五味好酒四升コキ煎取一升ニ分頓服大吐

治中風癱病方第廿二

病源論云五癱者一陽癱二陰癱三風癱四濕癱五馬癱也人有血氣少則心虛精神離散魂魄妄行目為風邪所傷邪入陰則為癱疾又人在胎時其母平大驚精氣并居令子發癱其發則作地吐涎沫無所覺是也セトル

千金方云治癱疾者視之有過者即畫之量其血於瓠葉之中至其發時血獨動矣ヒモコボル

范汪方治五癱方

鐵精一合 芎藭一兩 地床子五合 防風一兩ヒルミロ

凡四物合和搗下篩日三服日用一錢有驗昂愈

又方灸足澤穴在時中動脈セコ

効驗方高風散治癱勞方

蜀天雄一分 炮山茱萸一分 署預十四分 獨活八兩

一方八分 石南草十二分一方 人參十分 蜀附子二分一方

木一分 桂心十二分 干薑八分一方 烏頭六分炮

細辛一分

凡十二物酒下篩酒服方寸匕日三不知稍增以

知為度イニ

小品方治癱疾發作僵仆不知人言語妄見鬼方オコチ



木一分 桂心十二分 干薑八分 烏頭六分

細辛一分

凡十二物酒下篩服方寸匕日三不知稍增以

知為度

小品方治癰疾發作僵仆不知人言語妄見鬼方

狼瘡子三升漬酒五升漬出膠乾後內計盡膠子

搗治末蜜腹服四分日三

葛氏方云癰病方

灸陰莖上宛中三壯得少便通便愈

又方灸足大指聚毛中七壯

又新鷄冠血漉口中

千金方云風癰灸天窓百會各三百壯

狂癰坐言黃胃管百壯狂走癰疾灸大幽百壯

狂走癰癰灸季肋廿壯狂言妄語灸間使廿壯

狂走書怒悲泣灸巨攬隨年壯

治中風狂病方第廿三

病源論云狂病者由風邪入并於陽所為也風邪

入人血脉使人陰陽二氣虛實不調若一實一虛

則全血氣相并氣并於陽則為狂發則欲走或自

高賢稱神聖是也

千金方云狂發少卧不飢自高賢目辨知自貴大



病源論云狂病者由風邪入并於陽所為也風邪  
入人血脉使人陰陽二氣虛實不調若一實一虛  
則全血氣相并氣并於陽則為狂發則欲走或自  
高賢稱神聖是也

千金方云狂發少卧不飢自高賢目辨知自貴大  
善罵詈日夜不休

小品方治卒發狂方

用其人著地以冷水淋其面終日淋之

又云卒狂言鬼語方

以亂帶急合縛兩手又指便灸左右脇下對屈

肘頭兩火俱起灸七壯須臾鬼語自云姓名及

亡得去徐々詰問乃辭其手也

又云狂罵詈打方

灸口兩旁過顴九處赤白際各一壯并灸

背胛間名臣攬三日一報之

又方灸陰囊下縫廿壯女人者灸陰會也

葛氏方治卒發狂方

燒蠟蟻搗末服方寸匕日三

又方煮大三年陳補去滓服之

又云狂言鬼語方

針其足大母指爪甲下入小許即止

治虛熱方第廿四



葛氏方治卒發狂方

燒蠟カハル搗末服方寸匕日三

又方煮三年陳補去滓服之フリウカアサカハル

又云狂言鬼語方

針其足大母指爪甲下入小許セツコトナヒ即止ヤム又

治虛熱方第廿四

病源論云虛勞而生熱者是陰氣不足陽氣有餘故內外生於熱非邪從外來乘之セ

搔要方療一切虛熱氣擁滯結不通三黃丸方

黃連二兩 大黃二兩 黃芩三兩

上件三物搗蜜和丸如梧子食後服三丸日三

又云療心膈間虛熱氣上迫咽喉口乾方カク

茯苓五兩 麥門冬三升二合去心 烏梅肉二兩

石蜜丸如酸棗大含銷カキ之日夜含六七枚

若因食昂口苦者升麻三兩カキ

廣濟方療虛熱臨送不下食昂煩悶カク地黃飲方

生地黃汁六合 蘆根一握生麥門冬一升

人參八分 橘皮六分生薑八分 白蜜三合

切以水六升煮取二升去滓下地黃汁蜜分

溫カクモモハ三如人行四五里進一服不痢慎生菜熱ナラキナ

麵炙肉カクナク高ソクムキ麥ナラキナ猪ナラキナ蒜ナラキナ粘食ナラキナ

經心方大黃丸治虛熱食飲不消化頭眩引背ヒキ脅ヒキ獲ヒキ

粘女廉反  
与粘同  
相著也



人參八分 橘皮六分 生薑八分 白蜜三合

切以水六升煮取二升去滓下地黃汁蜜分

濕三如人行四五里進一服不痢慎生米熱

麵炙肉高麥猪蒜粘食

經心方大黃丸治虛熱食飲不消化頭眩引背脅痠

中介口中爛傷不著食方

大黃一兩 黃芩一兩 黃連三兩 苦參二兩

龍膽二兩

五味蜜丸如梧子服五丸日三

又玄生地黃煎火治虛熱及血利方

生地黃汁三升石內汁罏器中投微火上

煎令如飴服二合

効驗方龍膽丸治朝寒暮熱手足煩鼻張面青

不能飲食方

龍膽二兩 黃連二兩 黃芩二兩 人參二兩

芒硝二兩 大黃二兩

凡六物治下痢蜜丸如梧子服五丸日三不知

可至七丸

葛氏方云若針中熱結煩滿悶亂狂言起走者

方

以芫花一升水三升煮取升半以布漬湯中掬

切中上系復易



凡六物治下痢蜜丸如梧子服五丸日三不知可至七丸

葛氏方云若針中契結煩滿悶亂狂言起走者方

以芫花音元一升水三升煮取升半以布漬湯中掬音九中上音九煅復易音九

治客熱方第廿五

病源論云客熱者由人府藏不調生於虛熱

客於上則胃羸生淡實口苦舌干客於中

則煩心悶滿不能下食客於下則大便

難小便赤澀

脊婆方治人客熱方

生地黄根一握音九淨洗搗音九絞取汁內少許蜜少服之音九又方以竹瀝待音九少飲之

又云治季夏月客熱方

升麻兩 甘草一分音九 藍二分 人參一分

粟米一升音九 一方

以水五升煮取半升去滓夜露之平旦一服

之

又云治人舌澀不能食方

薤白十二分 人參二分 防己二分 切搗篩為散

以歐服一方寸匕日二服此方至夏月恒須早服之



粟米一升 一合

以水五升者大取半升去滓夜露之平旦一服

之

又云治人舌涎不能食方

薤白十二分 人參二分 防己二分 切搗篩為散

以歐脹一方寸匕日二服此方至夏月恒須早服之

無此病之

錄驗方竹茹湯治口中寒熱口生瘡爛不得食方

生竹茹四兩 生薑四兩 甘草二兩 前胡兩

伏苓二兩 橘皮二兩

凡六物水六升煮取二升分服半日盡

范任方陽達湯治胸中有熱喘逆肩息方

半夏半升 人參一兩 石膏如鷄子者一枚

生薑四兩 飴四兩

凡五物以水一斗五升煮得七升服一升日三

夜二

醫心方卷第三